

---

## Mathematisch-algorithmische Grundlagen für Data Science

### Lösungen zu Aufgabenblatt 1

---

#### Aufgabe 1 (Lineare Unabhängigkeit)

(a) Zeigen Sie, dass die Vektoren

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}$$

linear unabhängig sind.

(b) Zeigen Sie, dass die Vektoren

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

linear abhängig sind.

#### Lösung:

(a) Wir betrachten das LGS

$$\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \lambda_3 \mathbf{v}_3 = \mathbf{0},$$

also

$$\left( \begin{array}{ccc|c} -1 & 3 & 2 & 0 \\ 2 & -4 & 4 & 0 \\ 3 & 1 & -1 & 0 \end{array} \right).$$

Umformung ergibt

$$\begin{array}{l} \Rightarrow \\ (2) + 2(1) \\ (3) + 3(1) \end{array} \quad \left( \begin{array}{ccc|c} -1 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 8 & 0 \\ 0 & 10 & 5 & 0 \end{array} \right)$$

$$\begin{array}{l} \Rightarrow \\ (3) - 5(2) \end{array} \quad \left( \begin{array}{ccc|c} -1 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & -35 & 0 \end{array} \right)$$

$$\Rightarrow \lambda_3 = 0 \Rightarrow \lambda_2 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 0.$$

(b) Es gilt

$$\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3 = \mathbf{0},$$

also lässt sich  $\mathbf{0}$  auf nicht-triviale Weise darstellen. Damit sind die Vektoren  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$  linear abhängig.

## Aufgabe 2 (Lösbarkeit von linearen Gleichungssystemen)

Bestimmen Sie, ob die folgenden linearen Gleichungssysteme keine, genau eine oder unendlich viele Lösungen besitzen.

(a)

$$\begin{array}{rcrcrcrcl} 2x_1 & - & 3x_2 & = & 11 \\ 5x_1 & - & x_2 & = & 8 \\ x_1 & - & 5x_2 & = & 16 \end{array}$$

(b)

$$\begin{array}{ccccrcrcrcl} x_1 & + & x_2 & - & x_3 & = & 2 \\ -2x_1 & & & & x_3 & = & -2 \\ 5x_1 & - & x_2 & + & 2x_3 & = & 4 \\ 2x_1 & + & 6x_2 & - & 3x_3 & = & 5 \end{array}$$

(c)

$$\begin{array}{ccccrcrcrcl} x_1 & + & 2x_2 & + & 3x_3 & + & 4x_4 & = & 1 \\ -2x_1 & - & 4x_2 & - & 6x_3 & - & 8x_4 & = & -2 \\ 3x_1 & + & 6x_2 & + & 9x_3 & + & 12x_4 & = & 2 \end{array}$$

**Lösung:**

(a) Es gilt

$$r(\mathbf{A}) = r \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 5 & -1 \\ 1 & -5 \end{pmatrix} = 2,$$

weil die beiden Spaltenvektoren linear unabhängig sind und  $r(\mathbf{A}) \leq 2$  gelten muss. Weiterhin gilt

$$\begin{aligned} \det(\mathbf{A}|\mathbf{b}) &= \det \left( \begin{array}{cc|c} 2 & -3 & 11 \\ 5 & -1 & 8 \\ 1 & -5 & 16 \end{array} \right) \\ &= 2 \cdot (-1) \cdot 16 + 11 \cdot 5 \cdot (-5) + 1 \cdot (-3) \cdot 8 - 11 \cdot (-1) \cdot 1 - 8 \cdot (-5) \cdot 2 - 16 \cdot (-3) \cdot 5 \\ &= -32 - 275 - 24 + 11 + 80 + 240 \\ &= 0. \end{aligned}$$

Also sind die Spaltenvektoren von  $\mathbf{A}|\mathbf{b}$  linear abhängig. Daraus folgt  $r(\mathbf{A}|\mathbf{b}) = r(\mathbf{A}) = 2$ , also eindeutig lösbar.

(b) Es gilt  $\det(\mathbf{A}|\mathbf{b}) = -24 \neq 0$ . Daraus folgt  $r(\mathbf{A}|\mathbf{b}) = 4$ . Wegen  $r(\mathbf{A}) \leq 3$  ist damit das Gleichungssystem nicht lösbar.

(c)  $r(\mathbf{A}) = 1$ , denn die Spaltenvektoren von  $\mathbf{A}$  sind alle ein Vielfaches von  $\mathbf{a}^1$ . Dagegen ist  $\mathbf{b}$  kein Vielfaches von  $\mathbf{a}^1$ , somit gilt  $r(\mathbf{A}|\mathbf{b}) = 2$ . Also nicht lösbar.

## Aufgabe 3 (Berechnung der Determinante)

Berechnen Sie für die Matrix

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & -3 & 1 \\ -2 & 6 & 9 & 0 \\ 4 & -3 & -2 & 5 \end{pmatrix}$$

die Determinante  $\det(\mathbf{A})$  mit Hilfe der Leibniz-Formel.

**Lösung:**

| Nr.      | Permutation | Vorzeichen | Produkt                              | Ergebnis |
|----------|-------------|------------|--------------------------------------|----------|
| 1        | (1234)      | +          | $1 \cdot (-2) \cdot 9 \cdot 5$       | -90      |
| 2        | (1243)      | -          | $1 \cdot (-2) \cdot 0 \cdot (-2)$    | 0        |
| 3        | (1324)      | -          | $1 \cdot (-3) \cdot 6 \cdot 5$       | 90       |
| 4        | (1342)      | +          | $1 \cdot (-3) \cdot 0 \cdot (-3)$    | 0        |
| 5        | (1423)      | +          | $1 \cdot 1 \cdot 6 \cdot (-2)$       | -12      |
| 6        | (1432)      | -          | $1 \cdot 1 \cdot 9 \cdot (-3)$       | 27       |
| 7        | (2134)      | -          | $(-1) \cdot 1 \cdot 9 \cdot 5$       | 45       |
| 8        | (2143)      | +          | $(-1) \cdot 1 \cdot 0 \cdot (-2)$    | 0        |
| 9        | (2314)      | +          | $(-1) \cdot (-3) \cdot (-2) \cdot 5$ | -30      |
| 10       | (2341)      | -          | $(-1) \cdot (-3) \cdot 0 \cdot 4$    | 0        |
| 11       | (2413)      | -          | $(-1) \cdot 1 \cdot (-2) \cdot (-2)$ | 4        |
| 12       | (2431)      | +          | $(-1) \cdot 1 \cdot 9 \cdot 4$       | -36      |
| 13       | (3124)      | +          | $(-1) \cdot 1 \cdot 6 \cdot 5$       | -30      |
| 14       | (3142)      | -          | $(-1) \cdot 1 \cdot 0 \cdot (-3)$    | 0        |
| 15       | (3214)      | -          | $(-1) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot 5$ | 20       |
| 16       | (3241)      | +          | $(-1) \cdot (-2) \cdot 0 \cdot 4$    | 0        |
| 17       | (3412)      | +          | $(-1) \cdot 1 \cdot (-2) \cdot (-3)$ | -6       |
| 18       | (3421)      | -          | $(-1) \cdot 1 \cdot 6 \cdot 4$       | 24       |
| 19       | (4123)      | -          | $1 \cdot 1 \cdot 6 \cdot (-2)$       | 12       |
| 20       | (4132)      | +          | $1 \cdot 1 \cdot 9 \cdot (-3)$       | -27      |
| 21       | (4213)      | +          | $1 \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2)$ | -8       |
| 22       | (4231)      | -          | $1 \cdot (-2) \cdot 9 \cdot 4$       | 72       |
| 23       | (4312)      | -          | $1 \cdot (-3) \cdot (-2) \cdot (-3)$ | 18       |
| 24       | (4321)      | +          | $1 \cdot (-3) \cdot 6 \cdot 4$       | -72      |
| $\Sigma$ |             |            |                                      | 1        |

#### Aufgabe 4 (Cramersche Regel)

Lösen Sie das folgende lineare Gleichungssystem mithilfe der Cramerschen Regel (Satz 1.26):

$$\begin{array}{rrrrr} -2x_1 & + & 3x_2 & + & 3x_3 & = & 4 \\ 5x_1 & - & 2x_2 & - & 4x_3 & = & 2 \\ x_1 & + & x_2 & - & x_3 & = & -2 \end{array}$$

**Lösung:** Es gilt:

$$\begin{aligned} \det(\mathbf{A}) &= \begin{vmatrix} -2 & 3 & 3 \\ 5 & -2 & -4 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -4 - 12 + 15 + 6 - 8 + 15 = 12 \\ \det(\mathbf{A}_1) &= \begin{vmatrix} 4 & 3 & 3 \\ 2 & -2 & -4 \\ -2 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 8 + 24 + 6 - 12 + 16 + 6 = 48 \\ \det(\mathbf{A}_2) &= \begin{vmatrix} -2 & 4 & 3 \\ 5 & 2 & -4 \\ 1 & -2 & -1 \end{vmatrix} = 4 - 16 - 30 - 6 + 16 + 20 = -12 \\ \det(\mathbf{A}_3) &= \begin{vmatrix} -2 & 3 & 4 \\ 5 & -2 & 2 \\ 1 & 1 & -2 \end{vmatrix} = -8 + 6 + 20 + 8 + 4 + 30 = 60 \end{aligned}$$

Damit erhalten wir

$$x_1 = \frac{48}{12} = 4, \quad x_2 = \frac{-12}{12} = -1. \quad x_3 = \frac{60}{12} = 5.$$

### Aufgabe 5 (Leibniz-Formel und Cramersche Regel in Python)

- (a) Implementieren Sie die Leibniz-Formel zur Berechnung der Determinante einer quadratischen Matrix  $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ .

Hinweis: Mit der Funktion `itertools.permutations(range(n))` können Sie alle Permutationen für die Menge  $\{0, 1, \dots, n-1\}$  erzeugen.

- (b) Implementieren Sie die Cramersche Regel zur Lösung eines linearen Gleichungssystems  $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$  mit einer regulären Matrix  $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$  in Python.

Hinweis: Nutzen Sie Ihre Funktion aus Teil (a).

**Lösung:** siehe Homepage